# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт)

УТВЕРЖДЕНО: Директор Д. С. Воробьев

Оценочные материалы по дисциплине

Автотрофные прокариоты

по направлению подготовки

06.03.01 Биология

Направленность (профиль) подготовки: **Биология** 

Форма обучения Очная

Квалификация **Бакалавр** 

Год приема **2024** 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель ОП Д.С. Воробьев

Председатель УМК А.Л. Борисенко

### 1. Компетенции и индикаторы их достижения, проверяемые данными оценочными материалами

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания.
- ПК-2 Способен изучать научно-техническую информацию по направлению исследований и представлять результаты своих исследований в научном сообществе.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИОПК-2.1 Демонстрирует понимание принципов структурно-функциональной организации живых систем
- ИПК-2.1 Владеет навыком поиска и анализа научной информации по направлению исследований

#### 2. Оценочные материалы текущего контроля и критерии оценивания

Элементы текущего контроля:

- тесты;
- реферат;

Тест (ИОПК-2.1.)

- 1. Определите тип питания: источник энергии и электрона окисление нитрита, источник углерода углекислота.
- 2. Выберите из перечисленных типов питания те, которые свойственны эукариотическим организмам:
  - а. хемолитогетеротрофия
  - b. хемоорганогетеротрофия
  - с. фотолитоавтотрофия
  - d. фотоорганоавтотрофия
  - е. ни один из предложенных вариантов не является верным.
- 3. Кем было открыто существование литотрофии?
  - а. В.И. Вернадским
  - b. M. Бейеринком
  - с. С.Н. Виноградским
  - d. Л. Пастером
  - е. ни один из предложенных вариантов не является верным.

Ключи: 1 хемолитоавтотрофия, 2 b), c), 3 c).

Критерии оценивания: тест считается пройденным, если обучающий ответил правильно как минимум на половину вопросов.

Темы реферативных работ (ИПК-2.1,)

- 1. Метаногены, как источник парниковых газов
- 2. Классификация метаногенов их роль
- 3. Эволюция и экология метаногенов
- 4. сульфатредуцирующие бактерии значение
- 5. Классификация сульфатредуцирующих бактерий
- 6. Эволюция и экология сульфатредуцирующих бактерий

- 7. сульфатное дыхание
- 8. сульфатвосстанавливающие бактерии в нефтяных месторождениях

Критерии оценивания: реферат считается принятым, если обучающий осветил достаточный объем информации и ориентируется в материале.

## 3. Оценочные материалы итогового контроля (промежуточной аттестации) и критерии оценивания

*Текущий контроль* включает тесты, содержащие вопросы на знание основных понятий и теоретических положений.

Оценка за выполнение заданий в рамках текущего контроля вычисляется по пятибалльной системе.

Итоговый тест, состоит из 20-ти вопросов, проверяющих ИОПК-2.1 каждый из которых имеет не менее 4х вариантов правильного ответа. Предусмотрены также творческие вопросы, проверяющие ИПК-2.1. Ответ на вопрос без предлагаемых вариантов дается в развернутой форме.

#### Перечень теоретических вопросов:

- 1. Выберите правильное утверждение:
- а. аноксигенные фототрофные бактерии содержат фотохимические реакционные центры одного типа.
- б. аноксигенные фототрофные бактерии содержат фотохимические реакционные центры двух типов.
- в. оксигенные фототрофные бактерии содержат фотохимические реакционные центры одного типа.
- г. ни один из предложенных вариантов не является правильным.
- 2. К аноксигенным фотосинтезирующим прокариотам относятся:
- а. зеленые серные бактерии, пурпурные серные и прохлорофиты
- б. зеленые серные, пурпурные и бесцветные серные бактерии
- в. зеленые серные, пурпурные серные и пурпурные несерные бактерии
- г. ни один из предложенных вариантов не является правильным
- 3. Донором электрона для оксигенного фотосинтеза является:
- а. свет.
- б. Н<sub>2</sub>S.
- в. Н<sub>2</sub>О.
- г. ни один из предложенных вариантов не является правильным.

#### Критерии оценивания:

Оценка осуществляется следующим образом: 10 и менее баллов – не зачтено, более 10 баллов – зачтено.

### 4. Оценочные материалы для проверки остаточных знаний (сформированности компетенций)

Тест

- 1. Фотоавтотрофы получают энергию (ИОПК-2.1.)
- а) от световых волн

- b) от теплового (броуновского) движения атомов
- с) из органических молекул
- d) из неорганических молекул
- 2. Основная отличительная черта хемоавтотрофов это способность получать энергию из (ИОПК-2.1.)
- а) тепла горячих подводных источников
- b) неорганических соединений серы, железа, азота и других элементов
- с) богатых перегноем почв
- d) распада радиоактивных элементов

Ключи: 1 a), 2 b).

Теоретические вопросы (ИПК-2.1):

- а) Исследования С.Н. Виноградского по открытию хемосинтеза и автотрофии у прокариот.
- b) Облигатные и факультативные хемолитоавтотрофы. Миксотрофия.
- с) Особенности дыхательных цепей у хемолитотрофов.

#### Ключи:

- а) С. Н. Виноградский в своих исследованиях в 1887 году открыл хемосинтез способность микроорганизмов получать энергию из окисления неорганических веществ для синтеза органических соединений из углекислоты, что стало доказательством автотрофии у прокариот и заложило основы почвенной микробиологии и экологии микроорганизмов.
- С. Н. Виноградский не только разгадал загадку способа существования и причину накопления серы в клетках бактерий, но и правильно ответил на вопрос об их функции в природных процессах, показав, что серобактерии окисляют сероводород, а не образуют его, как считали современники (например, французский учёный Оливье). Выводы об окислении неорганических веществ, сделанные Виноградским на серобактериях, были, в целом, подтверждены на железобактериях. Это позволило оценить не только их тип метаболизма, но и экологическую роль в природе. Изучение бактерий нитрификаторов позволило выявить и доказать не только использование ими соединений азота как источников энергии, но и автотрофию; способность к автотрофии впервые была обнаружена у нефотосинтезирующих организмов. За этим последовал знаменательный экологический вывод: «Органическое вещество на земном шаре образуется при жизнедеятельности живых существ не только в процессе фотосинтеза, но и в процессе хемосинтеза». Занимался работами по усвоению бактериями атмосферного азота. Выделение первого свободноживущего азотфиксатора Clostridium pasteurianum позволило замкнуть схему круговорота азота в природе.

#### b) Облигатные хемолитоавтотрофы

Это микроорганизмы, получающие энергию за счет окисления неорганических веществ (например, серы, аммиака, водорода, железа) и использующие неорганический углерод (CO<sub>2</sub>) в качестве источника углерода для синтеза органических соединений.

Они строго зависят от неорганических источников энергии и углерода и не способны усваивать органические соединения для своих нужд.

Факультативные хемолитоавтотрофы

Это микроорганизмы, которые сочетают способность к хемолитотрофному питанию с возможностью использования органических веществ. Их также называют миксотрофами.

Они могут переключаться между использованием неорганических веществ для получения энергии и углерода и потреблением органических веществ, что дает им преимущество в изменчивых условиях.

Основное отличие заключается в гибкости метаболизма: облигатные хемолитоавтотрофы строго привязаны к неорганическим субстратам, тогда как факультативные могут использовать и органические соединения, что делает их более адаптивными.

с) Дыхательные цепи хемолитотрофов, в отличие от хемоорганотрофов, используют не органические вещества (например, HAДH), а неорганические субстраты в качестве доноров электронов, такие как  $H_2S$ ,  $H_2$ ,  $Fe^{2+}$ ,  $NH_3$ , и переносят их через систему белков к конечному акцептору электронов, который может быть как кислородом, так и неорганическими соединениями (например, нитратом), что приводит к синтезу  $AT\Phi$ . В качестве конечного акцептора электронов может выступать: Молекулярный кислород  $(O_2)$ , как у аэробных хемолитотрофов. Различные неорганические соединения, такие как нитрат (NO3-), сульфат  $(SO_4^{2-})$ , используемые анаэробными хемолитотрофами в процессе анаэробного дыхания.

### Информация о разработчиках

Панова Инна Андреевна, НИ ТГУ, кафедра физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики, старший преподаватель